



Transmisión maternoinfantil de HTLV-1 en Perú: conocimientos, actitudes y prácticas de mujeres

Macalupu J (1), Ginocchio F (1), Paiva A (1), **Cusihuallpa P** (2), Rodríguez-Hurtado D (2), Mejía-Cordero F (1), González-Lagos E (1), Gotuzzo E (1)

1. Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt, Universidad Peruana Cayetano Heredia

2. Facultad de Medicina, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

CONTEXTO

- HTLV-1 se transmite por **lactancia materna**
- Alta prevalencia en contextos vulnerables (limitaciones estructurales: **agua, desagüe**)

OBJETIVOS

- Comprender los conocimientos, las actitudes y las prácticas de mujeres en relación con la transmisión maternoinfantil del HTLV-1

MÉTODOS

- Estudio **transversal** descriptivo y exploratorio: **mujeres de entre 18 y 60 años que viven con HTLV-1** (Set - Dic 2022)
- Instrumento: cuestionario de 30 preguntas (**29 cerradas y una abierta**)

RESULTADOS

- **43 participantes**: mediana de 45 años (IQR 38-55,5)
- La mayoría de las mujeres identificaron la transmisión sexual (95 %), la lactancia materna (93 %) y las transfusiones de sangre (86 %) como posibles vías de transmisión
- Entre las mujeres con hijos (n = 40), **solo nueve habían sido diagnosticadas antes del embarazo**
 - De ellas, seis recordaban haber recibido consejería sobre la lactancia materna y **siguieron las recomendaciones**
 - Tres mujeres contaron que habían recibido **comentarios negativos de su entorno social** tras decidir no dar de lactar
- Temas emergentes: Información, Detección, Sistema de salud, Estigma, Experiencia emocional e Investigación
 - *«Algunos piensan que es igual que el VIH y no lo es»*
 - *«Toda persona gestante debería hacerse la prueba de HTLV-1 y que esta sea subvencionada por el estado»*
 - *«Al oír la noticia, me cayó como si me hubieran dicho que tenía cáncer. Me deprimí, me quería morir»*

Diagnóstico tardío de HTLV-1 → Oportunidad perdida de prevención

En el caso de **mujeres de zonas urbanas**, los conocimientos y las actitudes respecto a la prevención de la transmisión maternoinfantil del HTLV-1 fueron positivos

Se resalta la **necesidad de estudios de implementación en zonas desatendidas** para evaluar intervenciones de **tamizaje prenatal, consejería oportuna y acceso a sustitutos de leche materna**, considerando barreras estructurales y estigma